

# EFFECTO DEL MANEJO DEL DESTETE PRECOZ SOBRE COMPORTAMIENTO Y PESO DE TERNEROS



Pereira M., Aguilar N., Gándara L. y Slukwa M.  
 pereira.maria@inta.gov.ar

## INTRODUCCIÓN

En destete precoz (DP), los terneros no consiguen equiparar sus pesos con aquéllos que continúan al pie de madre. El objetivo fue evaluar el comportamiento y la evolución del peso vivo (PV) de terneros DP con dos alternativas de manejo.

## MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo se realizó en INTA Corrientes, Argentina, con 90 terneros, con peso y edad promedio de 70 Kg y 60 días respectivamente. El DP se hizo con DP tradicional (T1): el día del destete fueron separados de las madres y DP alternativo (T2): Previo al destete (20 días) se acondicionó un *creep feeding*, y el día del destete permanecieron próximos a las madres. El diseño experimental fue un DCA con tres repeticiones. Se registraron categorías de comportamiento los primeros 6 días post-destete, en la mañana, durante una hora y media. El peso vivo (PV) se registró al inicio y cada 28 días. Se analizó los datos de comportamiento utilizando Chi-cuadrado y para PV test de Tuckey, utilizando INFOSTAT.

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Hubo diferencias significativas ( $p < 0,05$ ) de comportamiento de los terneros entre los tratamientos (T1) y (T2) (Figura 1) y PV a favor del T2 donde los terneros lograron 23 kg de PV más comparados con los T1 (T1:162 kg vs T2:186 kg).




Figura 1: Porcentajes de actividades de los terneros según alternativa de manejo

**CONCLUSIÓN:** El DP alternativo, aumentó los comportamientos relacionados a la ingestión favoreciendo la ganancia de peso en comparación con los terneros DP tradicional.

